

DAI CARDIO-VASCOLARE E TORACICO UOC di Pneumologia	MU 306367 14
Sospensione farmaci per metacolina	Rev 2 del 14/03/2023 Pagina 1 di 2

TEST DI PROVOCAZIONE BRONCHIALE CON METACOLINA

All'atto dell'esecuzione del test dovranno essere sospesi, compatibilmente con il quadro clinico, i seguenti farmaci:

β_2 agonisti broncodilatatori a breve durata d'azione	6 ore
Fenoterolo (Dosberotec), Salbutamolo (Broncovaleas, Ventolin), etc Salbutamolo associato a steroide (Clenil compositum, Plenaer) Salbutamolo associato ad anticolinergico (Brevia)	
β_2 agonisti broncodilatatori a lunga durata d'azione	36
ore Formoterolo (Atimos, Eolus, Foradil, Oxis) Formoterolo associato a steroidi (Formodual, Foster, Inuver, Symbicort, Sinestic, Gibiter, Flutiformo) Salmeterolo (Arial, Salmeterdur, Serevent) Salmeterolo associato a steroidi (Aliflus, Seretide)	
β_2 agonisti broncodilatatori a lunghissima durata d'azione	48 ore
Vilanterolo associato a steroidi (Relvar, Revinty)	
Anticolinergici a breve durata d'azione	12 ore
Ipratropio (Atem), Ossitropio (Oxivent)	
Anticolinergici a lunga durata d'azione	5 giorni
Tiotropio (Spiriva)	
Antileucotrienici	24 ore
Montelukast (Luckasm, Montegen, Singulair)	
Antiistaminici	3 giorni
Cetirizina (Cerchio, Formistin, Reactine, Zirtec), Levocetirizina (Xyzal), Loratadina (Clarityn, Fristamin), Desloratadina (Aerius)	

Teofillinici per os
Aminomal, Diffumal, Respicur, Theo-Dur, Theolair,

24 ore

La sospensione degli steroidi inalatori non è consigliata.

UNITÀ OPERATIVA CON SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n. 194114



Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA - Tel 045/812 1111 - Fax 045/916735
C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: www.ospedaleunivero.it
