



Istruzione Operativa di Unità Operativa	IU 301565 53 Rev 9 del 23/03/2023 Pagina 1 di 17
DAI di PATOLOGIA e DIAGNOSTICA UOC di MICROBIOLOGIA	
ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DI CAMPIONI PER URINOCOLTURA	

ITER EMISSIONE	E. O.	RUOLO	NOME COGNOME	FIRMA
REDAZIONE*	UOC Microbiologia e Virologia	Coordinatore	Laura Poletto	
VERIFICA*	UOC Microbiologia e Virologia	Referente Qualità	Sonia Tozzi	
APPROVAZIONE*	UOC Microbiologia e Virologia	Direttore	Davide Gibellini	
DATI GESTIONE DOCUMENTO				
NOME FILE	IU 301565 53			
DATA PRIMA APPLICAZIONE	14/10/2023			
DISTRIBUZIONE	Controllata X			

L'esame batteriologico dell'urina (urinocoltura) ha lo scopo di valutare se nell'urina vi sono batteri in quantità tale da sostenere un'infezione delle vie urinarie.

E' perciò di fondamentale importanza seguire scrupolosamente le seguenti istruzioni nella raccolta del campione, per evitare la contaminazione dello stesso da parte di batteri provenienti da altre sedi.

- **Procurarsi l'apposito contenitore sterile** in farmacia o presso il Centro Prelievi dell'Azienda Ospedaliera di Borgo Trento o Borgo Roma,
- **raccogliere l'urina al mattino, subito dopo il risveglio**, nel modo indicato:
 - lavare i genitali con sapone e sciacquare con acqua corrente;
 - asciugare con asciugamani puliti o fazzoletti di carta appena aperti: le donne devono asciugare i genitali esterni procedendo dalla zona anteriore verso quella posteriore;
 - iniziare ad urinare nel water, scoprendo il glande o divaricando le labbra della vulva, quindi interrompere il getto di urina e continuare a urinare nel contenitore sterile riempiendo fino a metà;
 - chiudere il contenitore avendo cura di non toccare l'interno dello stesso e del coperchio,
- **consegnare il campione** presso il Centro Prelievi appena possibile.
Qualora non sia possibile consegnare il campione di urina entro un'ora dalla raccolta, conservare il campione in frigorifero consegnando comunque non oltre le 24 ore dalla raccolta.
- **Non saranno accettati:**
 - campioni in contenitori diversi da quello indicato;
 - campioni corrispondenti a minzioni successive alla prima del mattino.

Per i lattanti e per i bambini che non hanno ancora sviluppato il controllo volontario della minzione, utilizzare l'apposito sacchetto in vendita in farmacia.

Esso va applicato alla cute tramite la parte adesiva dopo un'accurata pulizia dei genitali esterni e va lasciando in sede finché il bambino non urina ma, possibilmente, per non più di un'ora (per evitare contaminazioni). Dopo la minzione, staccare il sacchetto dalla cute richiudendo facendo aderire i margini adesivi, quindi riporlo in un contenitore sterile. **Non trasferire l'urina dal sacchetto al contenitore** perché questa operazione può essere fonte di contaminazione,